

Tableau n° 9

Le Béryllium et ses composés

Date de création : 04 Avril 1974 ; N° JORT : 25/1974

Date de la dernière mise à jour : 10 Janvier 1995 ; N° JORT : 26/1995

Désignation des maladies	Délai de prise en charge	Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A- <u>Manifestations locales</u>		
Conjonctivites aiguës ou récidivantes.	5 jours	Travaux exposant au béryllium et à ses composés, notamment :
Dermites aiguës ou récidivantes.	5 jours	. Broyage et traitement du minerai de béryllium (Béryl).
B- <u>Manifestations générales</u>		
Broncho-pneumopathie aiguë ou subaiguë diffuse avec apparition retardée de signes radiologiques le plus souvent discrets.	30 jours	. Fabrication et usinage du béryllium, de ses alliages et de ses combinaisons. . Fabrication et utilisation de poudres à base de sels de béryllium destinées au revêtement intérieur des tubes à fluorescence.
Fibrose pulmonaire diffuse avec signes radiologiques, troubles fonctionnels et signes généraux (amaigrissement, fatigue) confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires y compris les complications cardiaques (insuffisance ventriculaire droite) et les complications pleuro-pulmonaires secondaires (pneumothorax spontané).	25 ans	